

محصولات دام کوچک


کمپانی بیووتا



شرکت هزار طب تهران



بیوکن ۸ گانه Biocan DHPPi+L



- **کاربرد:** واکسن زنده علیه دیستمپر، عفونت های هپاتیتی، عفونت های لارنگوترواکتیت، پارآنفولانزا، پاروویروس و واکسن غیر فعال علیه سه سویه ای لپتوسپیرا

• **ترکیبات:**
Virus febris contagiosae canis
Virus laryngotracheitidis contagiosase
Parvovirus enteritidis canis
Virus parainfluenzae canis
Nutrimentum pro lyophilisatione ad 1ml
Leptospira icerohaemorrhagiae inact ,
Leptospira canicola inact , Leptospira
grippotyphosa inact

بیوکن ۵ گانه Biocan Novel DHPPi

- **کاربرد:** واکسن زنده علیه دیستمپر، لارنگوترواکتیت، عفونت های هپاتیتی، پاروویروس و پارآنفولانزا
- Canine Distemper virus
Canine Adenovirus Type 2
Canine Parvovirus Type 2b
Canine Parainfluenza Type 2 virus

• **دستور مصرف:**
واکسن Biocan Novel DHPPi از ۶ هفتگی
واکسن Biocan DHPPi+L از ۸ هفتگی و تکرار بعد از ۲-۳ هفته
واکسن های لیوفیلیزه باید در مایع واکسن Biocan رقیق شود و بلافاصله پس از رقیق شدن مصرف گردد.

• موارد منع مصرف:

در حیوانات آبستن و بیمار مصرف نگردد.

• شرایط و مدت نگهداری:

در محیط خشک و خنک در درجه حرارت ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

در صورت عدم نگهداری در شرایط فوق، کیفیت واکسن تضمین نمیگردد.

۲۴ ماه پس از تولید


• **بسته بندی:** 5x1ml ، 10x1ml ، 50x1ml

• موارد احتیاط:

فقط سگ هایی که از لحاظ کلینیکالی در وضعیت سالم به سرمی برند باشند و واکسینه شوند.

درمان ضد انگلی باشند ۰ ۱ روز قبل از واکسیناسیون متوقف شود.

از تعلیم دادن و تربیت کردن سگ ها تا یک هفته پس از واکسیناسیون خودداری شود.



• کاربرد: واکسن غیر فعال شده علیه بیماری هاری جهت ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری هاری بعد از تزریق درون بدن حیوان هدف ، آتنی ژن موجود در واکسن به عنوان یک عامل خارجی شناسایی شده و باعث شدن شماری از مکانیسم های دفاعی (ماکرووفاژ ، اپسینین ها ، ایترلسین ها و لمفوسيت ها) می گردد. مجموعه مکانیسم های فعال شده از ابتلا به بیماری در صورت مواجهه با آن جلوگیری می کند. ایمنی از ۱۴ روز پس از واکسیناسیون آغاز می گردد.

• حیوان هدف:
سگ ، گربه ، حیوانات خزنده ، اسب ، شتر ، گوسفند ، گاو ، خوک و بز

• طریقه مصرف:
به صورت زیر جلدی S.C و یا تزریق عضلانی M.I از ۳ ماهگی ایمنی بعد از ۱۴ روز شروع می گردد. حیواناتی که قبل از ۳ ماهگی واکسینه شده باشند باقیستی مجددا در سن واکسیناسیون یک دوز دیگر دریافت کنند و لی می باقیستی حداقل فاصله ۱۴ روز رعایت شود. حیواناتی که در دوره ۳ تا ۱۲ ماهگی واکسینه شده باشند باقیستی دوز بعدی را یک سال بعد دریافت کنند.

• موارد منع مصرف:
در کلیه بیماری های تب زا در حیواناتی که توسط حیوانات مبتلا به هاری دچار گرفتگی و یا جراحت شده اند.

• شرایط و مدت نگهداری:
در محیط خشک و خنک در درجه حرارت ۲-۸ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت عدم نگهداری در شرایط فوق ، کیفیت واکسن تضمین نمی گردد.
۲۴ ماه پس از تولید
۷ روز پس از باز کردن





Biocan Novel DHPPi L4

واکسن بیوکن ۹ گانه

- کاربرد: واکسن زنده علیه دیستمپر، پارا ویروس، هپاتیت، لارنگوتراکسیت، پار آنفولانزا و واکسن غیرفعال علیه چهار سویه ای لپتوسپیرا

- ترکیبات:

Canine Distemper virus
Canine Adenovirus Type 2
Canine Parvovirus Type 2b
Canine Parainfluenza Type 2virus
Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae
Leptospira interrogans serogroup canicola
Leptospira kirschneri serogroup grippotyphosa
Leptospira interrogans serogroup australis

- حیوان هدف: سگ

- دوز مصرفی: ۱ میلی لیتر از ۸ هفتگی زده شود، ۳ تا ۴ هفته بعد تکرار شود و بعد از آن به صورت سالانه تکرار گردد.

- طریقه تزریق: زیرجلدی

- شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود، در مقابل نور و یخ زدگی محافظت گردد.

- بسته بندی: 10x1 dose ، 25x1 dose

- موارد مصرف: مصوّنیت فعال علیه Caliciviral infections, Feline Panleukopenia, Herpesviral
- ترکیبات :

Virus panleucopeniae contagiosae felis

Inactivatum min.10^{3.0} TCID₅₀

Herpesvirus felis inactivatum min.10^{5.0} TCID₅₀

Calicivirus felis inactivatum min.10^{5.5} TCID₅₀

Thiomersalum, solvens oleicum

• حیوان هدف: گربه




• دوز مصرفی: ۱ میلی لیتر

• روش تزریق: زیرجلدی ترجیحاً پشت ناحیه shoulder

• دستور مصرف: اولین دوز از سن ۸ تا ۱۰ هفتگی، دوز بعدی ۱۳ تا ۱۴ هفته بعد و بعد از آن تکرار سالانه

• شرایط نگهداری: در دمای ۲ تا ۸ درجه نگهداری گردد و در مقابل نور و یخ زدگی محافظت گردد.

• بسته بندی: 10 x 1 dose , 2 x 1 dose



- **موارد مصرف:** به منظور بی هوشی عمومی و بی حسی برای روند تشخیص و درمان استفاده می گردد.

- **ترکیبات:**

1ml of clear, colourless solution for injection contains:

Active ingredient: Ketaminum 100 mg

- **حیوان هدف:** سگ، گربه، اسب، میمون
- **روش مصرف:** به صورت وریدی یا عضلانی
- **دوز مصرفی:**
- **اسب:** ۲ میلی لیتر به ازای هر ۱ کیلوگرم وزن بدن، سریع و به شکل وریدی تزریق گردد.
به منظور ارتقا بیهوشی عمومی یک دوز دیگر می توان تزریق کرد.
در صورت ترکیب با دیگرداروهای آرامبخش ۱ / ۰ میلی گرم Acepromazine به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ۱۲۰ - ۱۵۰ میلی گرم Guaifenesine به ازای هرکیلو وزن بدن یا ۰ / ۶ - ۰ / ۴ میلی گرم Xylazin به ازای هرکیلو گرم وزن بدن به شکل وریدی تزریق گردد.
- **سگ:** ۱ / ۰ - ۱ / ۰ میلی لیتر به ازای هرکیلو گرم وزن بدن به صورت عضلانی
در صورت استفاده به شکل ترکیبی با دیگر داروهای آرامبخش، ۰ / ۵ میلی گرم Atropin به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به صورت وریدی، عضلانی، زیر جلدی همراه با ۱ / ۰ میلی گرم Acepromazine بعداز شروع اثر کتامین برای تزریق در یک دوز ۰ / ۲ میلی لیتر به ازای هر ۱ کیلو گرم وزن بدن کتامین.
- **گربه:** ۰ / ۲ - ۰ / ۰ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت عضلانی
در صورت استفاده به شکل ترکیبی با دیگر داروهای آرامبخش، ۰ / ۲ - ۰ / ۰ میلی لیتر کتامین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت عضلانی تجویز گردد.
- **منع مصرف:** در حیواناتی که شیر و گوشت آن ها مورد مصرف قرار می گیرد استفاده نگردد.
- **شرایط نگهداری:** از نور و یخ زدگی محافظت گردد.
- **بسته بندی:** ۵۰ میلی لیتر

قرص ضدانگل کنیورم Caniverm forte

- **موارد مصرف:** در بیماری هایی که به وسیلهٔ کرم های گرد و نواری ایجاد می شود.
- **ترکیبات:** حاوی فنبندازول ، پیراتل و پرازی کواتل
- **حیوان هدف:** سگ و گربه ، سگ سانان، گربه سانان
- **دوز مصرفی:**
در سگ های کوچک و گربه ها یک قرص ۱۷۵ / ۰ گرمی به ازای هر ۲-۵ کیلوگرم از وزن حیوان، نیمی از قرص ۷ / ۰ گرمی و یا دو قرص ۱۷۵ / ۰ گرمی به ازای هر ۵-۲ کیلوگرم از وزن حیوان
- در سگ های با جثه متوسط یک قرص ۷ / ۰ گرمی و یا ۴ قرص ۱۷۵ / ۰ گرمی به ازای هر ۵-۱ کیلوگرم از وزن حیوان
- در سگ های با جثه بزرگ یک قرص ۷ / ۰ گرمی به ازای اضافه شدن هر ۱ کیلوگرم به وزن
- **دستور مصرف:** به شکل خوراکی جدا یا همراه با غذا از سن ۳ تا ۱۲ هفتگی تجویز گردد، ۳ هفته بعد تکرار شود بعد از آن هر ۳ ماه تکرار گردد.
- **شرایط نگهداری:** در دمای زیر ۲۵ درجه در جای خشک و به دور از نور نگهداری گردد.
- **بسته بندی:** ۲ تایی، ۶ تایی، ۱۰۰ تایی



FIPRON 50 MG SPOT-ON SOLUTION FOR CATS فیپرون ۵۰ میلی گرم

- کاربرد: درمان و پیشگیری از آکودگی و بیماری های مرتبط با کک، کنه و شپش
- ترکیبات:
هر تیوب ۵/۰ میلی لیتری حاوی Fipronil 50mg
- حیوان هدف: گربه
- دز مصرفی:
مینیمم زمان بین دو بار استفاده باید حداقل ۴ هفته باشد.
- دستور مصرف:
۱ تیوب ۵/۰ میلی لیتری روی پوست بین شانه ها
(هر ۱ دز در مقابل آکودگی ها تا ۵ هفته برای کک و ۳ الی ۴ هفته برای کنه کافی است).

- موارد منع مصرف: در حیوانات جوان تر از ۸ هفته و کم تر از ۱ کیلوگرم نباید استفاده شود، در بیماری های سیستمیک و تب دار نباید استفاده گردد.
- شرایط و مدت نگهداری:
در محیط خشک و به دور از نور نگهداری شود.
۴ ماهه
بلافاصله پس از باز کردن استفاده گردد.

FIPRON 67 MG SPOT-ON SOLUTION FOR Dogs فیپرون ۶۷ میلی گرم

- کاربرد: درمان و پیشگیری از آکودگی و بیماری های مرتبط با کک، کنه و شپش
- ترکیبات:

هر تیوب ۶/۰ میلی لیتری حاوی Fipronil 67mg
• حیوان هدف: سگ

- دز مصرفی:
در سگ با وزن ۲ الی ۱۰ کیلوگرم یک تیوب استفاده گردد.
- دستور مصرف:
۱ تیوب ۶/۰ میلی لیتری روی پوست بین شانه ها

توجه:

- در موارد با ریسک بالای درگیری با کک به صورت ماهانه تکرار شود.
- در صورت آگرژی سگ به گرش کک و در صورت نیاز به شست و شوی متوالی سگ ها باید از شامپوهای ضد حساسیت و نرم کننده استفاده شود.
- مناطقی که حساسیت زیاد به گرش کک یا شپش ندارد می تواند هر ۲ تا ۳ ماه استفاده شود.

- ایجاد مقاومت در مقابل کک تا ۲ ماه و شپش تا ۱ ماه
- کک ها بعد از ۲۴ ساعت از استفاده از بین می روند.

- بسته بندی: بسته های ۱، ۳، ۵ و ۲۵ تایی
- شرایط و مدت نگهداری:

در محیط خشک و به دور از نور نگهداری شود.
۴ ماهه
بلافاصله پس از باز کردن استفاده گردد.



وارد کننده انحصاری

شرکت هزار طب تهران

تلفن: (+۹۸۲۱) ۸۸۶۹۲۸۲۸

فاکس: (+۹۸۲۱) ۸۸۶۹۰۸۰۸